

DIASPEN
Untimely injectable solution / Solución inyectable extemporánea



Composition:

Powder vial: Penicillin G sodium 1.250.000 I.U.; Penicillin G procaine 3.750.000 I.U.; Dihydrostreptomycin sulphate 3,125 g; Streptomycin sulphate 3,125 g.

Solvent vial: Sterile solvent to 25 ml.

Indications and target species:

Bovine, ovine, swine and equine².

Bacterial infections, post-operative and/or secondary to viral infections due to sensitive Gram (+) and Gram (-) germs and other germs like *Rickettsias*, *Leptospira spp.*, *Spirochaetes* (*Borrelia*, *Treponema*):

.*Bovine and ovine*: Cutaneous abscesses, Actinomycosis, Foot infections, Arthritis, Bacterial and symptomatic anthrax, Leptospirosis, Metritis, Pneumonia, Bronchopneumonia and Mastitis.

.*Swine*: Arthritis, Miscarriage (caused by *Brucellas*, *Leptospiras* and other sensitive germs), Leptospirosis, Erysipelas, Pneumonia, Bronchopneumonia, MMA syndrome.

.*Equine*: Metritis, Pneumonia, Bronchopneumonia, Mumps.

Dosage, administration route and use instructions:

Prepare the solution. Deep intramuscular route.

.*Big animals*: 5 ml of DIASPEN / 100 kg b.w., daily.

.*Small animals*: 0,1 ml of DIASPEN / kg b.w., daily.



Withdrawal period:

Meat: 30 days.

Milk: 3 days.

Presentation:

Box with 1 powder vial and 1 solvent vial of 25 ml.

Composición:

Vial polvo: Penicilina G sódica 1.250.000 U.I.; Penicilina G procaína 3.750.000 U.I.; Dihidroestreptomicina sulfato 3,125 g; Estreptomicina sulfato 3,125 g.

Vial disolvente: Disolvente estéril c.s.p. 25 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino, porcino y equino².

Infecciones bacterianas, post-operatorias y/o secundarias a infecciones víricas causadas por gérmenes sensibles tanto Gram (+) como Gram (-), además de otros gérmenes tales como *Rickettsias*, *Leptospira spp.*, *Espiroquetas* (*Borrelia*, *Treponema*):

.*Bovino y ovino*: Abscesos cutáneos, Actinomicosis, Afecciones podales, Artritis, Carbunco bacteriano y sintomático, Leptospirosis, Metritis, Neumonía, Bronconeumonía y Mamitis.

.*Porcino*: Artritis, Aborto (por *Brucellas*, *Leptospiras* y otros gérmenes sensibles), Leptospirosis, Mal rojo, Neumonía y Bronconeumonía, Síndrome MMA.

.*Equino*: Metritis, Neumonía, Bronconeumonía, Papera.

Dosis, modo y vía de administración:

Preparar la solución. Vía intramuscular profunda.

.*Grandes animales*: 5 ml de DIASPEN / 100 kg p.v. y día.

.*Pequeños animales*: 0,1 ml de DIASPEN / kg p.v. y día.

Período de supresión:

Carne: 30 días.

Leche: 3 días.

Presentación:

Caja con 1 vial polvo y 1 vial disolvente de 25 ml.

