

SUPER'S SPRAY
Topical aerosol / Aerosol tópico



Composition:

Chlortetracycline (hydrochloride) 3,56 g; Patent blue 0,14 g; Excipient to 200 ml.

Indications and target species:

Bovine, ovine, caprine, swine, poultry, equine, dogs and cats. To assist in surgical and superficial wounds. Coadjuvant treatment of foot-rot and other foot infections caused by Chlortetracycline-sensitive germs: Gram (+) and Gram (-) bacteria: *Streptococcus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Clostridium spp.*, *Fusobacterium spp.*; *Rickettsias*, *Chlamydias* and some protozoa.

Dosage, administration route and use instructions:

Topical route. Shake well before using.

Spray all the affected area from a distance of 20 cm. Repeat the treatment according to the evolution and seriousness of the wounds.

Withdrawal period:

In case of urgent slaughter, confiscate the treated area.

Presentation:

Flask of 200 ml.

Composición:

Clortetraciclina (clorhidrato) 3,56 g; Azul patente 0,14 g; Excipiente c.s.p. 200 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino, caprino, porcino, aves, equino, perros y gatos. Heridas quirúrgicas y superficiales, tratamiento coadyuvante del pedero y otras infecciones podales causadas por los siguientes gérmenes sensibles a la Clortetraciclina: Bacterias Gram (+) y Gram (-): *Streptococcus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Clostridium spp.*, *Fusobacterium spp.*; *Rickettsias*, *Chlamydias* y algunos protozoos.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía tópica. Agitar el spray antes de usarlo.

Pulverizar la zona afectada a una distancia de 20 cm. Repetir el tratamiento según evolución y gravedad de las lesiones.

Período de supresión:

En caso de sacrificio de urgencia, confiscar la zona tratada.

Presentación:

Frasco de 200 ml.

