

VERMIFOR ECTO
Injectable solution / Solución inyectable



Composition:

Closantel 5 g; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

Bovine¹ and ovine¹.

Hepatic distomatosis (preventive and curative), larvary phase of estrosis, subcutaneous hypodermosis and nematodosis by haematophagous.

Dosage, administration route and use instructions:

Intramuscular and subcutaneous route in bovine.

Subcutaneous route in ovine.

.Bovine:

- *Distomatosis and gastrointestinal nematodosis:* 0,5 ml of VERNIFOR ECTO / 10 kg b.w., in a single dose.
- *Hypodermosis:* 1 ml of VERNIFOR ECTO / 10 kg b.w., in a single dose.

.Ovine:

- *Estrosis and gastrointestinal nematodosis:* 0,5 ml of VERNIFOR ECTO / 10 kg b.w., in a single dose.
- *Distomatosis:* 1 ml of VERNIFOR ECTO / 10 kg b.w., in a single dose.

Withdrawal period:

Meat: 28 days.

Milk: Do not use.

Presentation:

Vials of 100 ml and 250 ml.

Composición:

Closantel 5 g; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino¹ y ovino¹.

Distomatosis hepática (preventivo y curativo), estrosis en fase larvaria, hipodermosis en fase subcutánea y nematodosis por hematófagos.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía intramuscular o subcutánea en bovino.

Vía subcutánea en ovino.

.Bovino:

- *Distomatosis y nematodosis gastrointestinales:* 0,5 ml de VERNIFOR ECTO / 10 kg p.v., en dosis única.
- *Hipodermosis:* 1 ml de VERNIFOR ECTO / 10 kg p.v., en dosis única.

.Ovino:

- *Estrosis y nematodosis gastrointestinales:* 0,5 ml de VERNIFOR ECTO / 10 kg p.v., en dosis única.
- *Distomatosis:* 1 ml de VERNIFOR ECTO / 10 kg p.v., en dosis única.

Período de supresión:

Carne: 28 días.

Leche: No usar.

Presentación:

Viales de 100 ml y 250 ml.