DOXBROM Oral soluble powder / Polvo soluble oral



Composition:

Doxycycline (hyclate) 50 g; Excipient to 100 g.

Indications and target species:

Poultry.

Colibacillosis, C.R.D. and Mycoplasmosis caused by microorganisms sensitive to Doxycycline.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water.

Administer 50-100 mg of Doxycycline / litre of drinking water / day, for 3-5 days (equivalent to 0,1-0,2 g of DOXBROM / litre of drinking water / day).

During the treatment animals must only drink medicated water. It is recommended to change the medicated water every 12 hours.

Withdrawal period:

Meat: 7 days.

Presentation:

Bags of 200 g in containers of 10 kg. Bags of 1 kg in containers of 20 kg.



Composición:

Doxiciclina (hiclato) 50 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

Indicaciones y especies de destino:

Pollos.

Colibacilosis, C.R.D. y Micoplasmosis producidas por gérmenes sensibles a la Doxiciclina.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida.

Administrar 50-100 mg/litro de agua de bebida/día. durante 3-5 días (equivalente a 0,1-0,2 g de DOXBROM / litro de agua de bebida/día).

El agua medicada será la única fuente de bebida.

Se recomienda renovar el agua medicada cada 12 horas.

Período de supresión:

Carne: 7 días.

Presentación:

Bolsas de 200 g en envases de 10 kg. Bolsas de 1 kg en envases de 20 kg.

