

**Withdrawal period:***Meat: 6 days.***Presentation:**

Sacks of 25 kg.

**Composición:**

Lincomicina (clorhidrato) 44 g; Excipiente c.s.p. 1 kg.

**Indicaciones y especies de destino:**

Porcino.

Lincomicina es un antibiótico del grupo de las licosamidas. Es activo básicamente frente a gérmenes Gram(+) y Micoplasmas: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp* (cepas beta-hemolíticas), *Streptococcus viridans*, *Clostridium tetani*, *Clostridium perfringens*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Leptospira spp.*, *Mycoplasmas*.

LINCOSAN está indicado en el tratamiento de la disentería porcina y tratamiento y control de la neumonía enzootica, producidas por cualquiera de los gérmenes citados anteriormente.

**Composition:**

Lincomycin (hydrochloride) 44 g; Excipient to 1 kg.

**Indications and target species:**

Swine.

Lincomycin is an antibiotic of the licosamides group. It is active basically against Gram (+) germs and Mycoplasmas: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp* (beta-haemolytic strains), *Streptococcus viridans*, *Clostridium tetani*, *Clostridium perfringens*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Leptospira spp.*, *Mycoplasmas*.

LINCOSAN is indicated in the treatment of swine dysentery and treatment and control of enzootic pneumonia, which are produced by the above mentioned germs.

**Dosage, administration route and use instructions:**

Oral route, mixed with feedstuff. Mix well in order to assure a homogenous distribution.

*Dysentery:* Treatment and control: 2,5 kg of LINCOSAN / ton feedstuff, for 3 weeks or until the symptoms disappear, followed by 1 kg of LINCOSAN / ton feedstuff, for 4 weeks. Control: 1 kg of LINCOSAN / ton feedstuff before appearing the symptoms or after the treatment.

*Enzootic Pneumonia:* Treatment: 5 kg of LINCOSAN / ton feedstuff, for 3 weeks or until the symptoms disappear.

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía oral, mezclado con el pienso. Mezclar bien para asegurar una distribución homogénea.

*Disentería:* Tratamiento y control: 2,5 kg de LINCOSAN / Tm de pienso, durante 3 semanas o hasta la remisión de los síntomas, seguido de 1 kg de LINCOSAN / Tm de pienso, durante 4 semanas. Control: 1 kg de LINCOSAN / Tm de pienso antes de la aparición de los síntomas o después del tratamiento.

*Neumonía enzootica:* Tratamiento: 5 kg de LINCOSAN / Tm de pienso, durante 3 semanas o hasta la remisión de los síntomas.

**Período de supresión:***Carne: 6 días.***Presentación:**

Sacos de 25 kg.

