

Composición:

Espectinomicina (clorhidrato) 22 g; Lincomicina (clorhidrato) 22 g; Excipiente c.s.p. 1 kg.

Indicaciones y especies de destino:

Porcino.

Prevención y tratamiento de la disentería vibriónica, control de la neumonía enzoótica y colibacilosis. La mezcla de ambos antibióticos resulta activa frente a: *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *E. coli*, *Mycoplasmas*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* (cepas beta-hemolíticas), *Str. viridans*, *Clostridium tetani*, *Cl. perfringens*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Leptospira spp.*

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, mezclado con el pienso. Mezclar bien para asegurar una distribución homogénea.

Administrar 1-2 kg de LINCOTRIMEX PREMIX por tonelada de pienso, durante 4-7 días.

Período de supresión:

Carne: 7 días.

Presentación:

Sacos de 25 kg.

LINCOTRIMEX PREMIX

Oral medicated premix powder / Polvo premezcla medicamentosa oral

**Composition:**

Spectinomycin (hydrochloride) 22 g; Lincomycin (hydrochloride) 22 g; Excipient to 1 kg.

Indications and target species:

Swine.

Prevention and treatment of vibrionic dysentery, control of enzootic pneumonia and colibacilosis. The combination of both antibiotics is active against the following germs: *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *E. coli*, *Mycoplasmas*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* (beta-haemolytic strains), *Str. viridans*, *Clostridium tetani*, *Cl. perfringens*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Leptospira spp.*

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, mixed with feedstuff. Mix well in order to assure a homogenous distribution.

Administer 1-2 kg of LINCOTRIMEX PREMIX per ton of feedstuff, for 4-7 days.

Withdrawal period:

Meat: 7 days.

Presentation:

Sacks of 25 kg.

