

METAMPEN

Oral medicated premix powder / Polvo premezcla medicamentosa oral

**Composition:**

Metampicillin sodium 300 g; Excipient to 1 kg.

Indications and target species:

Pre-ruminant calves, pre-ruminant ovine, pre-ruminant caprine, swine and poultry.

Infections produced by the following sensitive microorganisms: *Actinomyces spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Bacillus anthracis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Clostridium spp.*, *E. coli*, *Corynebacterium spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Haemophilus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Moxarella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Shigella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*, *Leptospira spp.*

Infections located in respiratory and urogenital tracts, skin and soft tissues; Arthritis; MMA syndrome; Streptococcoses; Tail necrosis.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, mixed with feedstuff. Mix well in order to assure a homogenous distribution.

Administer 1-1,5 kg of METAMPEN per ton of feedstuff.

Withdrawal period:

Meat: 3 days.

Presentation:

Sacks of 25 kg.

Composición:

Metampicilina sódica 300 g; Excipiente c.s.p. 1 kg.

Indicaciones y especies de destino:

Terneros pre-rumiante, ovino pre-rumiante, caprino pre-rumiante, porcino y aves.

Infecciones causadas por los siguientes gérmenes sensibles: *Streptococcus spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Clostridium spp.*, *E. coli*, *Corynebacterium spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Moxarella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Shigella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*, *Leptospira spp.*.

Infecciones del tracto respiratorio y urogenital, en piel y tejidos blandos; Artritis; Síndrome MMA; Streptococcoses; Necrosis del rabo.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, mezclado con el pienso. Mezclar bien para asegurar una distribución homogénea.

Administrar 1-1,5 kg de METAMPEN por tonelada de pienso.

Período de supresión:

Carne: 3 días.

Presentación:

Sacos de 25 kg.

